


Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I.
kategorije

**“MJESTO I ULOGA KOLPOSKOPIJE U RANOJ
DIJAGNOZI I PREVENCIJI NEOPLASTIČKIH
PROMJENA VRATA MATERNICE I DONJEG
GENITALNOG TRAKTA”**

CD ATLAS DIFERENCIJALNO DIJAGNOSTIČKIH PROBLEMA
(Prof.dr.sc. Goran Grubišić- vlastita fotodokumentacija)


- Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 - Hrvatsko društvo za kolposkopiju i bolesti vrata
maternice HLZ
 - Hrvatsko društvo ginekologa i opstetričara HLZ
- Zagreb, 14. i 15. prosinca 2006.

- Citološki CIN III,
kolposkopski SKG
vidljiva izvijugana, a
na 11 h izduljena, kao
zaljev, acetobijela
slika



© Goran Grubišić, 2006

- Isto u zelenom svjetlu po Kraatzu




© Goran Grubišić, 2006

- Još bolji prikaz nakon Schillerova testa, kada se i na stražnjoj usni prikazuje jod negativno polje od 4-8 h
- Ekskohleacija i ciljana probna ekscizija CIN III




© Goran Grubišić, 2006

- Excisio diathermica (LETZ konizacija)
- PHD: CIN III




© Goran Grubišić, 2006


- Citološki CIN III, kolposkopski SKG djelomično vidljiva na prednjoj usni, u TZ obilna, dijelom promijenjena vaskularizacija prema abnormalnoj slici



- U zelenom svjetlu po Kraatzu pojedinačne krvne žile bolje prikazane, jače kalibrirane




- Schiller test pozitivan na kolposkopski opisanom polju, te još i na dijelu stražnje usne bliže unutarnjem ušću
- Probna ekscizija CIN III




© Goran Grubišić, 2006

- Citološki CIN III, kolposkopski SKG vidljiva, u TZ obilna, dijelom promijenjena vaskularizacija prema abnormalnoj slici





© Goran Grubišić, 2006

- U zelenom svjetlu po Kraatzu pojedinačne krvne žile bolje prikazane, jače kalibrirane




© Goran Grubišić, 2006

- Schiller test pozitivan na kolposkopski opisanom polju, te još i na dijelu stražnje usne bliže unutarnjem ušću
- Na donjoj slici se dobro vidi i jod negativno polje prednje usne prema forniksu
- Olakšan izbor mjesta za probnu eksciziju, uz predhodnu ekskohleaciju cervikalnog kanala
- PHD CIN III




- Citološki CIN III u trudnoći
- Kolposkopski evertirana prednja usna s izraženim acetobijeljenjem i obilnim cervikalnim iscjetkom




® Goran Grubišić, 2006

- Prostrano jod negativno polje na predhodno opisanoj porciji u trudnice
- S obzirom da je slika stacionarna, sprovedeno je u trudnoći citološko i kolposkopsko praćenje, a definitivno rješavanje odloženo za razdoblje nakon završetka babinja




© Goran Grubišić, 2006

- Citološki CIN III u trudnoći
- Kolposkopski evertirana prednja usna s izraženim acetobijeljenjem i obilnim cervikalnim iscjetkom




© Goran Grubišić, 2006

- Prostrano jod negativno polje na predhodno opisanoj porciji u trudnice
- S obzirom da je slika stacionarna, sprovedeno je u trudnoći citološko i kolposkopsko praćenje, a definitivno rješavanje odloženo za razdoblje nakon završetka babinja




© Goran Grubišić, 2006

- Citološki CIN III
- Kolposkopski SKG
izvijugana s tračcima
izraštavanja , a
periferno cirkularno
acetobijelo polje u
razini, oštro ograničeno
od okoline, a u njemu
crtež nježnijeg mozaika-
prednja usna



- Schiller test pozitivan, olakšava ciljanu probatornu eksciziju



© Goran Grubišić, 2006


- Citološki CIN III
- Kolposkopski SKG
izvijugana s tračcima
izraštavanja , a periferno
cirkularno acetobijelo
polje u razini, oštro
ograničeno od okoline, a
u njemu crtež nježnijeg
mozaika- stražnjausna



- Schiller test pozitivan, olakšava ciljanu probatornu eksciziju



- Citološki CIN III
- Kolposkopski SKG vidljiva, izvijugana, acetobijeljenje izraženo, iznad nivoa, a stječe se dojam i međusobno isprepletenih tračaka acetobijeljenja
- Ovo isprepletanje ukazuje na podležeću jaču leziju i s tog mjesta je potrebna probna ekscizija



© Goran Grubišić, 2006

- Schiller test pozitivan, te je olakšana ciljana ekscizija



- Citološki CIN III
- Kolposkopski SKG vidljiva, izvijugana, acetobijeljenje izraženo, iznad nivoa, a stječe se dojam i međusobno isprepletenih tračaka acetobijeljenja
- Ovo isprepletanje ukazuje na podležću jaču leziju i s tog mjesta je potrebna probna ekscizija
- Ovo je slika stražnje usne porcije iste pacijentice




- Schiller test pozitivan, te je olakšana ciljana ekscizija




© Goran Grubišić, 2006

- Citološki ASC- H
- Kolposkopski nezadovoljavajući nalaz zbog vulnerabilne, hipoestrinemiške površine porcije i SKG koja je tik uz vanjsko ušće
- Uz to i petehije i ekhimoze





© Goran Grubišić, 2006

- Schiller test, za razliku od onoga u predhodnih bolesnica, pokazuje inhomogeno i “sfumato” primanje joda
- Ciljana biopsija otežana, i izvršena nakon lokalnog oporavka Vagifemom
- PHD CIN I




© Goran Grubišić, 2006

- Citološki
Ca.planocellulare
- Kolposkopski
vulnerabilna površina
okružena vijencem
izraženog acetobijelog
epitela iznad nivoa
- Probna ekscizija
carcinoma planocellulare
corneum
- Klinički IB₁



- Citološki
Ca.planocellulare
- Kolposkopski
vulnerabilna površina
okružena vijencem
izraženog acetobijelog
epitela iznad nivoa
- Probna ekscizija
carcinoma planocellulare
corneum
- Klinički IB₁




© Goran Grubišić, 2006


- Klinički condylomata accuminata multiplicitia perianalia et perinealia
- Inspekcijom kondilomi "medularni"
- Pacijentica prije ikakve intervencije, upućena u obradu imunološkog statusa




- Citološki bez abnormalnosti,
- Kolposkopski SKG evertirana, portio inflamirana







- SKG vidljiva, portio evertirana, ne prikazuju se krvnožilne abnormalnosti na površini porcije





- Schiller test je u ove pacijentice negativan. Naime jod prima okolni višeslojnopločasti epitel, a evertirani hipertrofični, polipozni i inflamirani endocervikalni epitel ga ne prima




- Citološki CIN I
- Kolposkopski se portio teže prikazuje jer je gornja trećina rodnice sužena
- Pod zelenim svjetlom se ne prikazuju krvno žilne abnormalnosti



- Schillerovim testom su se pokazala polja pogodna za probatornu eksciziju



- Posthisterektomijska krupno resičasta kupola u pacijentice kod koje je lijevi jajnik s endometriotskom cistom nalegao na stanjenu vaginalnu kupolu i pacijentica je redovno mjesečno “menstruirala” kroz taj otvor iz komunikacije jajnik-kupola



- Condylomata accuminata perinei u 22. godišnje djevojke
- Shodno iskustvu izvršena i kolposkopija pri čemu je otkriven papiloma exophyticum stražnje usne na 8 h kao i nepravilno acetobijelo polje, u razini, izvijugano i dobro ograničeno od okoline

